



[Accueil](#) > [Biologie](#) > [Autres rongeurs présents dans l'écosystème prairial](#) > [Le campagnol agreste](#) > [Le campagnol agreste](#)

**Le campagnol agreste, *Microtus agrestis*, est un mammifère rongeur qui fait partie de la famille des Muridés et de la sous famille des Arvicolinés.**

Il est présent en Eurasie, dans toute la France à l'exception des îles. Il ressemble beaucoup au campagnol des champs.



### **Morphologie :**

- Longueur tête corps : 8,5 à 13 cm, queue : 2,5 à 4,6 cm
- Poids : 20 à 48 g
- Pelage : assez long et hirsute, gris-brun au dessus et plus foncé au dessous. Le cou et les pieds sont gris-blancs
- Longévité : 2 ans

### **Régime alimentaire :**

Le campagnol agreste se nourrit essentiellement des parties vertes des plantes, il préfère les jeunes pousses et les graines. Il consomme également l'écorce des jeunes arbres jusqu'à 15 cm de hauteur.

### **Habitat et indices :**

Il aime les biotopes humides. Les coulées faites entre les touffes de graminées mènent à l'entrée des galeries souvent superficielles. Il aime être protégé par de hautes herbes. On le trouve souvent en prairie, au bord des champs, dans les clairières, les haies, les taillis, les bois clair, les tourbières. Les indices sont les crottes vertes entassées dans les coulées.

### **Reproduction :**

La période de reproduction s'étend de mars à octobre. Le nombre de petits par portée peut varier de 2 à 9.

### **Les dégâts :**

Les forestiers le combattent pour ses dégâts occasionnés sur le bois.