



Accueil > Santé publique / Maladies transmissibles > La maladie du poumon du fermier > La maladie du poumon du fermier

Maladie causée par l'inhalation de la poussière contenant des fines particules de moisissures qui proviennent souvent de fourrages, céréales ou paille insuffisamment secs.

1- Les facteurs qui aggravent la production des moisissures

- La récolte de fourrages dans de mauvaises conditions météorologiques (régions humides, forte pluviométrie), la présence de terre due à la prolifération des tumuli de campagnols ;
- Techniques de récolte : hauteur de coupe, pressage,
- Le mode de conditionnement : le stockage du foin à l'extérieur mais aussi en balles rondes favorise le développement des moisissures par rapport à du vrac séché en grange ;
- Le lieu de stockage (hangars peu ventilés, exposés aux intempéries, ou au dessus de l'étable...).

2- Quels sont les symptômes de la maladie du poumon fermier ?

Toux, crachats (accroissement d'excrétions (mucus)), essoufflement, fièvre et frissons, douleurs dans la poitrine ou les poumons.

La prévention consiste à éviter tout contact avec les poussières contaminées de moisissure. Il existe des médicaments pour soulager les symptômes du poumon fermier mais il n'y a pas de remède à l'hypersensibilité aux (poussières de) moisissure.

3- Pour en savoir plus

- Le réseau PAPPAL (Pathologies Allergiques Pulmonaires, Professionnelles Agricoles et des Indépendants), MSA Franche-Comté, contact : Cécile TRAVERS (coordinatrice du réseau)
- Le programme PATURE (Protection contre l'Allergie : éTUde du milieu Rural et de son environnement), MSA Franche-Comté
- MSA Franche-Comté, contact : Jean-Michel LORNET (médecin du travail)